

Observation et Prescription

données essentielles

NOM :

Prénom :

né le : _ / _ / _

ATCD (...)

Autres médecins

cardio oph
 psy autre

Pathologies actuelles (...)

Personne de confiance :

Entourage

Clairance de la créatinine : le : _ / _ / _

Hb : le : _ / _ / _

Glycémie : le : _ / _ / _

TA

_ / _ le : _ / _ / _

Chutes

oui non

TA debout

_ / _ le : _ / _ / _

Vue

A B C

TA couchée

_ / _ le : _ / _ / _

Autonomie (1)

A B C

Pouls

_ / min le : _ / _ / _

Mémoire

A B C

Poids

_ kg le : _ / _ / _

Moral

A B C

Poids habituel _ kg

(1) Pour évaluer l'Autonomie

confinement à domicile ? Le malade gère t'il seul son alimentation, son budget, son courrier, le téléphone, les médicaments, les comptes?

Allergies

ATCD iatrogènes

Gestion du traitement malade aidant

Observance (2) A B C

Collyre pour glaucome?(3) oui non timoptol....

Dernière révision de traitement le : _ / _ / _

TRAITEMENT actuel (...)

(2) Pour dépister le risque de défaut d'observance (mauvaise adhésion au traitement) :

« La plupart des gens ont des difficultés à prendre tous leurs médicaments comme leur médecin le leur a prescrit. Avez-vous parfois des difficultés à prendre certains de vos médicaments? Lesquels? A quelle fréquence? »

Haynes, R.B., Taylor, D.L., & Sackett, D.L., (Eds.). (1979). *Compliance in health care*. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

«Quand cela vous est arrivé, quelles en étaient les raisons?»

Principaux facteurs de risque : troubles mnésiques, dépression, polymédication, présence d'effets secondaires ou indésirables

(3) Il est important de rechercher la prise de collyre pour glaucome à base de β bloquant, car l'association à un β bloquant par voie générale peut favoriser un surdosage