I. DÉFINITION

Les médicaments concernés par cette fiche correspondent à des formes pharmaceutiques commercialisées ne permettant pas une administration par sonde de nutrition ou pour lesquelles certains patients peuvent avoir des difficultés à avaler.

II. OBJECTIFS

Proposer des pratiques de bon usage pour la préparation et l'administration de formes solides permettant une prise orale facilitée chez des patients particuliers, en tenant compte de la stabilité et de la toxicité des principes actifs et de la galénique de la spécialité commercialisée.

III. PERSONNES CONCERNÉES

Personnel soignant, IDE, pharmacien, préparateur.

IV. REFERENCES

☞ Cette liste est le résultat de la compilation des informations délivrées par les laboratoires pharmaceutiques et des documents suivants :

- Les bonnes pratiques d'administration OMEDIT Haute Normandie (2011)
- Du bon usage des médicaments en gériatrie. CH du Mans Pharma-Fiches V3- 2011
- Liste des médicaments administrables par sonde CH Nîmes.
- Livret d'utilisation des médicaments par voie orale, CHU Clermont-Ferrand, service pharmacie.
- Formes orales sèches et nutrition entérale pars sonde naso gastrique. Fiche bon usage Omédit Région centre.
- Couper ou écraser les comprimés oui ou non ? de la théorie à la pratique. Pharmacie des HUG juin 2007.
- Liste des médicaments administrables par sonde : Hélène Poujol - Pharmacien - CHU Caremeau -Nîmes.
- Dictionnaire Vidal 2007

☞ Cette liste n'est pas exhaustive et elle nécessitera une actualisation régulière.

☞ Vous pouvez contactez l'ORMEDIMS pour signaler toute erreur.

V. RÈGLES DE BONNES PRATIQUES

COUPER, ECRASER, OUVRIR, QUELS SONT LES RISQUES POTENTIELS ?

- **Erreur de dosage**, sur ou sous dosage.
- **Toxicité locale** avec irritation ou ulcération des muqueuses.
- Modification des propriétés physico-chimiques, pharmacocinétiques ou pharmacologiques engendrant **une toxicité, ou une perte d'effet**.

REGLES GENERALES

- En l'absence de rainure sur un comprimé, la division est aléatoire et devrait être évitée. Il est préférable d'utiliser un autre dosage, une autre forme ou spécialité.
- Il ne faut pas couper, écraser, ouvrir les formes orales
  - ✓ Gastro-résistantes (sauf pour les sondes jéjunales)
  - ✓ A libération modifiée (retard, LP, LM, Oros, …..), les gélules LP peuvent être ouvertes mais leur contenu non écrasé.
  - ✓ Contenant des principes actifs instables à l'air ou à la lumière
  - ✓ à base de substances irritantes
  - ✓ contenant des principes actifs toxiques
  - ✓ contenant des substances à marge thérapeutique étroite (AVK, anticonvulsivants, digoxine)
  - ✓ contenant un excipient huileux (capsules)

EN PRATIQUE ?

- Vérifier si le médicament ne peut être remplacé par une autre forme (liquide, sachet, cp effervescent, dispersible, suppositoire) ou un autre médicament.
- Vérifier si le comprimé peut être écrasé ou coupé, la gélule ouverte.
  - ✓ Sur le Vidal à la rubrique posologie.
  - ✓ Sur le guide d'utilisation des médicaments ou le livret thérapeutique.
  - ✓ En appelant la pharmacie
- Pour couper un comprimé utiliser de préférence un partage comprimé
- Ne pas écraser les comprimés d'avance. Les principes actifs peuvent être instables à l'air, à la lumière
- Ne pas écraser plusieurs comprimés en même temps.
- Pulvériser le plus finement possible et ajouter un volume de liquide suffisant ou un aliment pour cacher un goût désagréable
- Laver le mortier ou le broyeur après chaque utilisation
- Bien rincer la sonde de nutrition entérale après administration du médicament

COUPER, ECRASER LES COMPRIMES, OUVRIR GELULES : OUI OU NON ?

POURQUOI EST-CE EVENTUELLEMENT DANGEREUX ?

Risque de sous ou sur dosage
Risque de toxicité locale
Risque de modification de l'absorption (surdosage)
Risque de destruction du médicament (perte d'effet)

REGLES GENERALES

NE PAS ECRASER

Comprimé à libération modifié (LM, LP, retard, Oros…)
Comprimé gastro-résistant (Sauf si administration par sonde jéjunale)
Comprimé contenant des substances instables à l'air, la lumière.
Comprimé contenant des substances toxiques ou irritantes
Capsule contenant un excipient huileux
Comprimé contenant des principes actifs à marge thérapeutique étroite (Antivitamines K, anticonvulsivants, digoxine)

OU RECHERCHER L'INFORMATION ?

Consulter le Vidal à la rubrique « POSOLOGIE »
Consulter le livret du médicament ou un guide d'utilisation des formes orales
Appeler la Pharmacie

EN PRATIQUE

Vérifier si le médicament ne peut être remplacé par une autre forme (liquide, sachet, comprimédispersible…) ou une autre spécialité

Vérifier si le comprimé, gélule, peut être ouvert, écrasé, coupé

Pour couper utiliser un partage comprimé

Ne pas écraser les comprimés d' avance

Broyer un seul produit à la fois

Ajouter un volume de liquide suffisant ou mélanger à un aliment pour cacher l'amertume

Laver le mortier ou le broyeur après chaque utilisation

Bien rincer la sonde de nutrition après administration

Modalités d'Administration des Médicaments sous forme solide (Gélule, comprimé,…)

Légende

Ne pas écraser

écrasement possible

Ne pas ouvrir

ouverture possible

A déliter dans un verre d'eau

ne pas ouvrir

SPECIALITES	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
ABILIFY cp 5, 10, 15 mg		non		utiliser forme cp orodispersible
ABSTRAL 100 mg cp		non	faire fondre le cp sous la langue	dispositif transdermique, spray nasal
ACEBUTOLOL cp 200, 400 mg		oui	goût amer	solution buvable 40 mg/ml
ACICLOVIR cp 200, 800 mg		non		solution buvable 200 mg/5 ml, 800 mg/10 ml
ACIDE TIAPROFENIQUE cp sécable 100 mg		oui	ne pas prendre à jeun	
ACTISKENAN gél		oui	ne pas écraser les granules	
ACTONEL cp 5, 30, 35, 75 mg		non	30 mn avant la prise d'aliments ou de boissons (lait) . Risque d'oesophagite.	
ACTOS cp 15, 30 mg		non	absence d'étude mais pharmacocinétique ne s'opposant pas	
ADALATE LP cp libération prolongée 20 mg		non	forme à libération prolongée	
ADANCOR cp 10, 20 mg		oui	ne pas dissoudre dans l'eau	
ADIAZINE cp 500 mg		oui	goût amer	
ADIXONE cp 50 mg		oui	peut être dissout dans du jus de fruit ou de l'eau	
ADVIL cp 100, 200, 400 mg		oui	goût amer, administrer immédiatement après dissolution	solution buvable 20 mg/ml, cp effervescent
ALDACTAZINE cp pelliculé sécable 25 mg/15 mg		oui	insoluble dans l'eau, à mélanger dans du sirop ou les aliments	
ALDACTONE cp pelliculé sécable 25, 50, 75 mg		oui	insoluble dans l'eau, à mélanger dans du sirop ou les aliments	
ALDOMET cp 250, 500 mg		oui	administrer immédiatement: PA photosensible	
ALEPSAL cp 15, 50, 100, 150 mg		oui	très dur à écraser	
ALKERAN cp 2 mg		non	cytotoxique: manipulation avec précaution	

SPECIALITES	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
ALLOPURINOL cp 100, 200, 300 mg		oui	avec boisson ou aliment	
ALPRAZOLAM cp sécable 0,25, 0,5, 1 mg		oui		
ALPRESS LP cp 2,5, 5 mg		non	forme à libération prolongée	Minipress, Eupressyl
ALTOCEL gél 2 mg		non		Imodium solution buvable 0,2 mg/ml
AMAREL cp 1, 2, 3, 4 mg		oui		
AMBROXOL cp sécable 30 mg		non		Ambroxol solution buvable 0,3 ou 0,6 %
AMIODARONE cp sécable 200 mg		oui		
AMLOR gél 5, 10 mg		oui	Longue demi-vie (35 à 50 heures)	
AMOXICILLINE /ACIDE CLAVULANIQUE cp pelliculé 500 mg /62.5 mg		non	Interdit d'écraser les cp	Amoxicilline/Acide clavulanique sachet
AMOXICILLINE cp dispersible 1g		oui	Après dispersion	
AMOXICILLINE gél 500 mg		oui		Amoxicilline dispersible
ANAFRANIL cp 10, 25, 75 mg		non	Si nécessité absolue, seules les formes 25 et 10 mg peuvent être écrasées (cp à 75 mg : cp pelliculé à matrice)	
ANAUSIN LP cp 15 mg		non	Forme à libération prolongée	
ANCOTIL cp 500 mg		oui		
ANDROCUR cp 50, 100 mg		oui		
ANSATIPINE gél 150 mg		oui	Ouverture des gelules juste avant administration	
AOTAL cp 333 mg		non	Comprimé gastro résistant, modification de la pharmacocinétique	
APRANAX cp 550, 750 mg		non	Goût très amer, irritation de la gorge	Apranax sachet, granulés pour suspension buvable

SPECIALITES	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
APROVEL cp 75, 150, 300 mg		oui	Possible mais pas d'étude laboratoire	
ARAVA cp 10, 20, 100 mg		oui	Aucune étude, PA toxique et très sensible à l'humidité	
ARICEPT cp 5, 10 mg		oui		Cp orodispersibles à préférer
ARIMIDEX cp 1 mg		oui	cytotoxique: manipulation avec précautions	
ARTANE cp 2,5 mg		non		Artane gouttes buvables
ARTHROCINE cp 100, 200 mg		non	Aucune étude réalisée	Autre AINS dispersibles
ASASANTINE LP gél 25 mg		non	Forme à libération prolongée	Utiliser les 3 principes actifs séparemment
ATACAND cp 4, 8, 16, 32 mg		oui		
ATARAX cp 25, 100 mg		oui	Préferer la forme sirop car goût désagréable	Atarax sirop, Bromazepam, Alprazolam
ATENOLOL cp 50, 100 mg		oui		
ATHYMIL cp 10, 30, 60 mg		oui	Utiliser rapidement, effet anesthésique de contact	Laroxyl gouttes
AUGMENTIN cp 500 mg /62.5 mg		oui	Préférer forme sachet	Augmentin sachet
AVLOCARDYL cp sécable 40 mg		oui		
AVLOCARDYL LP gél 160 mg		oui	Résistance lors de l'ouverture Ne pas écraser les granules	
AXELER CP 20 mg/5 mg		non	Association de principes actifs, à avaler tel quel	
AZANTAC cp effervescent 75, 150, 300 mg		oui	Administrer après dissolution	
AZANTAC cp pelliculé 150, 300 mg		oui		Préférer la forme effervescente
BACLOFENE cp 10 mg		non		
BACTRIM ADULTES cp 80 mg/400 mg		oui	Goût désagréable. Préférer la forme buvable	Bactrim solution buvable

SPECIALITES	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
BACTRIM FORTE cp 160 mg/800 mg		oui	Goût désagréable. Préférer la forme buvable	Bactrim solution buvable
BAYPRESS cp 10, 20 mg		non		
BEFIZAL cp 200 mg		oui	Aucune étude réalisée	
BEFIZAL LP cp 400 mg		non	Forme à libération prolongée	Lipanthyl gél. ou Befizal cp 200 mg
BELUSTINE gel 40 mg		non	cytotoxique: manipulation avec précautions	
BENEMIDE cp 500 mg		oui		
BETAHISTINE cp 8 mg		oui		
BETNESOL cp effervescent 0,5 mg		oui	Après dissolution	
BEVITINE cp 250 mg		oui	Goût désagréable	
BILTRICIDE cp 600 mg		oui	Se désagrège dans l'eau	
BI-PROFENID cp 150 mg		non	Forme à libération prolongée	Profenid cp 100 mg suppositoire ou autre AINS
BISOPROL cp pelliculé sécable 10 mg		oui		
BI-TILDIEM LP cp 90, 120 mg		non	Forme à libération prolongée	
BREXIN cp 20 mg		non		Brexin cp effervescent
BREXIN cp effervescent 20 mg		oui	Après dissolution	
BRICANYL LP cp 5 mg		non	Forme à libération prolongée	Oxeol 10 et 20 mg, Ventoline buvable, Salbutamol suppo
BRIEM cp 5, 10 mg		non	Modification de la biodisponibilité	Cibacene
BROMAZEPAM cp quadrisécable 6 mg		oui		
BURINEX cp 1,5 mg		oui	Administration immédiate PA photosensible	

SPECIALITES	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
BUSPAR cp sécable 10 mg		oui	Ne pas administrer avec du jus de pamplemousse	
BUSPIRONE cp sécable 10 mg		oui		
CACIT cp 500 mg effervescent		oui	Après dissolution	
CALCIPRAT cp à sucer ou à croquer		oui		
CALCIPRAT VITAMINE D3 cp à sucer ou à croquer		oui		
CALCIUM cp effervescent 500 mg		oui		
CALTRATE cp 600 mg		oui		
CALTRATE VITAMINE D3		oui		
CAPTEA cp sécable 50 mg/25 mg		oui		
CAPTOLANE cp sécable		oui		
CAPTOPRIL cp 25, 50 mg		oui		
CARBAMAZEPINE LP cp 200, 400 mg		non	Forme à libération prolongée	
CARBOLEVURE ADULTE gél		oui		
CARDENSIEL cp 1,25, 2,5, 3,75, 5, 7,5, 10 mg		oui		
CATAPRESSAN cp 0,15 mg		non	Aucune étude réalisée	Autres anti HTA centraux : Aldomet, Hyperium
CELEBREX gél 100, 200 mg		oui		
CELECTOL cp pelliculé sécable 200 mg		oui	Ne doit pas être en contact avec la muqueuse buccale	Il existe d'autres βbloquants en solution buvable: Sectral
CELESTENE cp 0,5 mg		oui		
CELESTENE cp dispersible 2 mg		oui	après dispersion	

SPECIALITES	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
CELIPROLOL cp pelliculé sécable 200 mg		oui	Ne doit pas être en contact avec la muqueuse buccale	Il existe d'autres βbloquants en solution buvable: Sectral
CELLCEPT cp 500 mg		non	Produit tératogène (masque, gants)	poudre pour susp buvable
CELLCEPT gél 250 mg		non	Produit tératogène (masque, gants)	poudre pour susp buvable
CELLTOP capsule 25, 50, 100 mg		non	Excipient irritant les muqueuses. Impossible car capsule	
CEPOREXINE cp 1000 mg		non		Solution buvable
CEPOREXINE gél 500 mg		non		Solution buvable
CHIBRO-PROSCAR cp 5 mg		oui	Pas de manipulation par la femme enceinte	
CHRONADALATE LP cp 30 mg		non	forme libération prolongée	Autres inhibiteurs calciques
CIFLOX cp 250, 500, 750 mg		oui		suspension buvable
CIMETIDINE cp 200, 400, 800 mg pelliculé		non		Tagamet effervescent
CIPRALAN cp pelliculé 130 mg		non	Aucune étude réalisée	
CIPROFLOXACINE cp pelliculé 250, 500, 700 mg		oui		
CITALOPRAM cp pelliculé sécable 20 mg		oui	goût amer	Goutte buvable
CLAMOXYL cp dispersible 1 g		oui	après dispersion	
CLAMOXYL gél 500 mg		non		suspension buvable 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml, 500 mg/5 ml
CLARITYNE cp 10 mg		non		Solution buvable, cp effervescent
CLARITYNE cp effervescent 10 mg		oui	Après dissolution	
CLASTOBAN gel 400 mg		oui	Si nécéssité absolue + avec de l'eau, en dehors des repas, pas de laitage	

SPECIALITES	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
CLASTOBAN cp 800 mg		oui	Si nécéssité absolue + avec de l'eau, en dehors des repas, pas de laitage	
CLODRONATE DE SODIUM cp 400 mg		oui	Avec de l'eau, en dehors des repas, pas de laitage	
CLOPIXOL cp 10 mg		non	Préférer la solution buvable mélangée avec de l'eau	Solution buvable 2 %
CLOPIXOL cp 25 mg		non	Préférer la solution buvable mélangée avec de l'eau	Solution buvable 2 %
CLOZAPINE cp 25, 100 mg		non	Ecrasement possible mais pas de dissolution dans l'eau	
COLCHIMAX cp 1, 12,5, 50 mg		oui		
COLTRAMYL cp 4 mg		oui		
COLIMYCINE 1,5 MUI		oui	Peu soluble dans l'eau préferer la forme poudre pour sirop	
COMBIVIR cp Blisters		non	Mélanger à une petite quantité de nourriture semi-solide ou de liquide	Epivir + Retrovir solution buvable
COMTAN cp 200 mg		non	Ne surtout pas dissoudre dans l'eau. Risque perte PA au cours du broyage	
CONCERTA LP cp 18, 36, 54 mg		non	Forme libération prolongée	
CONTRAMAL gél 50 mg		oui	Contenu amer donc diluer dans aliments semi-liquides	
CONTRAMAL LP cp dosage 100, 150, 200 mg		non	Forme libération prolongée	
COPEGUS cp 200 mg		non	Ne pas croquer	Rebetol solution buvable
CORDARONE cp sécable 200 mg		oui		
CORTANCYL cp 1, 5, 20 (séc) mg		oui		Autre forme orodispersible : Solupred
CORTISONE cp 5 mg		oui	Administration extemporanée car PA sensible à la lumière	Autre forme orodispersible : Solupred
CORVASAL cp 2,4 mg		oui	Administration extemporanée car PA sensible à la lumière	
COUMADINE cp 2,5 mg		oui	Produit à marge thérapeutique étroite, attention à la dose ⚠	

SPECIALITES	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
COVERSYL cp 2,4 mg		oui		
COZAAR cp 50, 100 mg		oui	Goût amer	
CRÉON gél 12000 U, 25000 U		oui	Ne pas écraser	
CRESTOR cp 5, 10, 20 mg		oui	Possible mais pas d'étude laboratoire	
CRIXIVAN gél 100, 200, 400 mg		oui	Goût amer	
CYMBALTA gél 30, 60 mg		oui	Possibilité de mélanger avec de la compote ou du jus de pomme	
CYMEVAN gél 250 mg		oui		
CYNOMEL cp 25 µg		oui		
CYTOTEC cp 200 µg		oui	Admistration immédiate avec de l'eau ou du lait	
DAFALGAN gél 500 mg		oui		Préferer Efferalgan cp effervescent
DAFALGAN CODEINE cp		non	Déconseillé d'écraser car très amer	préferer Efferalgan codeine en cp effervescent
DAFLON cp 500 mg		oui	Admistration immédiate avec de l'eau ou un aliment	
DAKTARIN cp 125 mg		oui	Possibilité de mélanger avec du lait	
DALACINE gél 150 mg		oui		
DANTRIUM gél 25, 100 mg		oui		
DAONIL cp sécable 5 mg		oui	prise avant le repas goût amer	
DAONIL FAIBLE cp 1,25 mg		oui	prise avant le repas goût amer	
DEBRIDAT cp pelliculé 100 mg		non	Non recommandé par le labo car absence d'étude pharmacocinétique	suppositoire à 100 mg sachet à 74,4 mg / granulés
DECADRON cp sécable 0,5 mg		non	adapter la posologie avec le médecin car pas la même DCI	Celestène 0,05 % goutte buvable 1 cp = 160 gouttes = 4 ml

SPECIALITES	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
DECTANCYL cp sécable 0,5 mg		non	adapter la posologie avec le médecin car pas la même DCI	Celestène 0,05% goutte buvable 1 cp = 160 gouttes = 4 ml
DELURSAN cp pelliculé 250 mg		oui	mélanger avec de la confiture ou de la compote, goût amer	
DEPAKINE cp gastrorésistant 200 mg		non	cp gastrorésistant	solution buvable 200 mg/ml
DEPAKINE cp 500 mg		non	Cp gastroresistant	solution buvable ou Micropakine sachet
DEPAKINE CHRONO cp sécable 500 mg		non	Sécable. Ne pas écraser/disperser dans un liquide (perte de l'effet LP)	solution buvable ou Micropakine sachet
DEPAKOTE cp gastrorésistant 500 mg	?	non	cp gastrorésistant	
DEPAMIDE cp gastrorésistant 300 mg		non	Ne pas croquer	
DEPRENYL cp sécable 5 mg		oui	prise le matin	
DEROXAT cp sécable 20 mg		oui	le pelliculage masque le goût	préférer Déroxat en suspension buvable
DETENSIEL cp sécable 10 mg		oui	plus aliment car goût amer	
DIAMICRON cp sécable 30 mg		oui		
DIAMICRON cp sécable 80 mg		oui		
DIAMOX cp sécable 250 mg		oui	plus aliment ou sirop de fruit pour cacher l'amertume	
DICODIN cp LP 60 mg		non	forme à libération prolongée	
DICYNONE cp 500 mg		oui		préférer Dicynone inj dilué dans l'eau et administrer par voie orale
DIFFU K gél 600 mg = 8 mEq K+		oui	éviter la prise simultanée de lait	Potassium Richard en sirop 3 % ou en sachet
DIFRAREL cp 100 mg		oui		
DIGOXINE cp sécable 0,25 mg		non	Produit à marge thérapeutique étroite, attention à la dose.	solution buvable 5 µg/0,1 ml,

SPECIALITES	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
DIHYDAN cp sécable 100 mg		oui	déconseillé d'écraser	
DIHYDROERGOTAMINE cp 3 mg		non		solution buvable 2 mg/ml
DIPIPERON cp 40 mg		non	Aucune étude réalisée	solution buvable 40 mg/ml
DISULONE cp sécable 100 mg		oui	plus confiture ou yaourt	
DITROPAN cp sécable 5 mg		oui		
DOGMATIL gél 50 mg		non		solution buvable
DOGMATIL cp sécable 200 mg		non	Aucune étude réalisée	solution buvable
DOLIPRANE cp 500 mg		oui	très amer	sachet, cp effervescent, suppositoire
DOLIPRANE gél 500 mg		oui	très amer	sachet, cp effervescent, suppositoire
DOPERGINE cp sécable 0,2 mg		oui	administration immédiate PA photosensible	
DUPHASTON cp pelliculé 10 mg		oui	plus aliment administration immédiate	
DUSPATALIN cp enrobé 100 mg		non	PA photosensible	solution buvable 10 mg/ml
EBIXA cp pelliculé sécable 10 mg		oui	Goût amer	solution buvable 5 mg/pression
EFFERALGAN CODEINE cp effescent		oui	faire dissoudre	
ECAZIDE cp sécable 50 mg/25 mg		oui		
EFFERALGAN CODEINE cp effervescent 500 mg/30 mg		oui	faire dissoudre	
EFFERALGAN cp effervescent		oui	faire dissoudre	
EFFEXOR LP gél 37 mg		oui	Ne pas écraser les microgranules	
EFIENT cp 10 mg		oui	goût amer, peut être mélangé avec des aliments et des liquides	

SPECIALITES	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
EFFORTIL cp 5 mg		non		Hep-a-myl oral sol buv ou effortil solution buvable 1 cp = 10 gouttes
ELAVIL cp 25 mg		non		Laroxyl sol buv (1 mg/goutte)
ELISOR cp 10, 20, 40 mg		oui		
EMEND gél 125, 80 mg		non	la gélule doit être avalée entière	
ENALAPRIL cp sécable 5, 20 mg		non	hydrolyse du PA	
ENDOXAN cp 50 mg		non	cytotoxique : manipulation avec précautions	
ENTOCORT gél 3 mg		oui	ne pas écraser les granules, avec jus d'orange ou coca	
EPITOMAX gél 15 mg		oui		
EPIVIR cp 150 mg		non		solution buvable 10 mg/ml
EQUANIL cp 250, 400 mg		oui	mélanger avec de la confiture ou de la compote	
ERCEFURYL gél 200 mg		non	Goût amer	Ercefuryl oral 4 % susp buv
ESIDREX cp 25 mg		oui	goût désagréable	
ESKAZOLE cp 400 mg		oui	peut être mélangé à des aliments ou être mâché	
ESPERAL cp 500 mg		oui		
ESTRACYT gél 140 mg		non	cytotoxique : manipulation avec précaution	
EULEXINE cp 250 mg		oui		
EUPANTOL cp 20, 40 mg		non	cp gastrorésistant	Inexium, OgastOro
EUPHYLLINE L.A. gél LP 50, 100, 200, 300, 400 mg		oui		
EUPRESSYL gél 30 mg (flacon)		oui	sans écraser le contenu	

SPECIALITES	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
EURELIX gél LP 6 mg		oui	sans écraser le contenu	
EUROBIOL gél 25000 U		oui	A dissoudre dans quelque chose d'épais (pas dans du liquide)	
EUTHYRAL cp 20 µg/100 µg		non		
EXELON gél 1,5, 3, 4,5, 6 mg		non		Exelon solution buvable 2 mg/ml
EXTRANASE cp 900 nK		non	cp gastrorésistant	
FAMOTIDINE cp pellicullé 20, 40 mg		non		Inexium, Ogastoro
FANSIDAR cp 500 mg/25 mg		oui		
FARLUTAL cp 500 mg		oui		
FELDENE gel 10, 20 mg		non	A avaler telles quelles avec un grand verre d'eau	Feldene cp orodispersible
FEMARA cp 2,5 mg		non	ne pas dissoudre, administrer de façon extemporanée sur un aliment semi-solide	
FENOFIBRATE gél 67, 100, 160, 200, 300 mg		oui		
FLAGYL cp pelliculé		oui	goût désagréable	Flagyl suspension buvable 4 %
FLECAINE cp 100 mg		oui		
FLODIL cp LP 5 mg		non	forme à libération prolongée	autre IC : amlodipine gelule
FLOXYFRAL cp 50, 100 mg		oui	PA irritant	
FLUDEX cp LP 1.5 mg		non	Ne pas croquer	autre diurétique hypokaliémiant, Lasilix, Esidrex
FLUDROCORTISONE cp 50 µg		oui	Administration extemporanée	
FLUOXETINE gél 20 mg		oui		Fluoxetine solution buvable, cp dispersible
FLUTAMIDE EG cp 250 mg		oui		

SPECIALITES	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
FLUVERMAL cp 100 mg		oui		Fluvermal oral 20 mg/ml solution buvable
FONZYLANE cp 150 mg		oui		
FOSAMAX cp 10, 70 mg		non	PA très irritant pour la muqueuse	
FUCIDINE cp 250 mg		oui	PA amer, administration immédiate	Préférer Fucidine enfant 250 mg/5ml suspension buvable
FUMAFER cp 66 mg		oui		Fumafer pdre oral 33 mg/1 g
FUROSEMIDE cp sécable		oui	administration immédiate PA photosensible	
GARDENAL cp 10-50-100 mg		oui		
GLIBENESE cp 5 mg		oui		
GLICLAZIDE cp sécable 80 mg		oui		
GLIVEC cp 100 mg		non	cytotoxique: manipulation avec précaution	
GLUCOPHAGE cp pelliculé 850, 1000 mg		non	cp 1000 mg est sécable	poudre pour susp buvable en sachet-dose
GLUCOPHAGE cp 500 mg		oui		poudre pour susp buvable en sachet-dose
GLUCOR cp 50, 100 mg		oui		
GRISEFULINE cp 500 mg		oui	peut être mélangé à un aliment liquide	
GUTRON cp 2.5 mg		oui	Non recommandé par le labo car absence d'étude pharmacocinétique	
GYNERGENE CAFEINE cp		non	Aucune étude	préférer forme suppo
HALDOL cp 1,5 mg		non	PA photosensible	Haldol solution buvable
HALFAN cp 250 mg		non		Halfan suspension buvable (1 c mesure = 100 mg)
HEMI-DAONIL cp sécable 2,5 mg		oui		

SPECIALITES	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
HEMIGOXINE cp 0,125 mg		non	Marge thérapeutique étroite	solution buvable 5 µg/0,1 ml
HEPT-A-MYL cp		non		Hept-a-myl solution buvable (1 cp = 15 gouttes)
HEXASTAT gél		non	cytotoxique: manipulation avec précaution	port de gants, de masque si ouverture
HUMATIN gél 250 mg		oui		
HYDREA gél 500 mg		non	Cytotoxique: manipulation avec précaution Certains excipients persistent en surface	port de gants, de masque si ouverture
HYDROCORTISONE 10 mg cp		oui		
HYPERIUM cp 1 mg		oui		
HYPOSTAMINE cp blister 100 mg		oui		
HYTACAND cp 8, 16 mg		oui	Association de principes actifs	
IBUPROFENE cp 200 mg		oui	goût amer	
ICAZ LP gél 2,5, 5 mg		non	forme à libération prolongée	autre IC: amlodipine gélule
IMIGRANE cp pélliculé 50 mg		non	Aucune étude réalisée Goût désagréable ou amer	solution pour pulvérisation nasale
IMODIUM gél 2 mg		non		Imodium oral 0,2 mg/ml solution buvable, cp linguaux
IMOVANE cp 3,75, 7,5 mg		oui	PA photosensible	
IMUREL cp 50 mg		non	cytotoxique: manipulation avec précaution	port de gants, de masque si broyage
INDOCID gél 25 mg		non		forme suppo
INEXIUM cp 20, 40 mg		oui	disperser le comprimé dans un peu d'eau	Préférer les granulés 10 mg pour suspension buvable sachet
INVIRASE gél 200 mg		oui		

SPECIALITES	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
ISOPRINOSINE cp 500 mg		oui		
ISOPTINE cp 40, 120 mg	o	oui		
ISOPTINE gél 120 mg		oui		
ISOPTINE LP 240 mg		non	forme à libération prolongée	Isoptine gél 120 mg ou cp 40 mg
ISORYTHM gél 100 mg		oui		
ISORYTHM gél LP 125, 250 mg		oui	ne pas écraser les granules	
IXEL gél 25, 50 mg		oui		
IXPRIM cp		oui		
JOSIR gél LP 0,4 mg		oui	ne pas écraser les granules	
IZILOX cp sécable 400 mg		non	PA photosensible	
KALEORID cp LP 1000 mg		non	forme à libération prolongée	sirop de potassium
KALETRA cp pelliculé 100 mg/25 mg, 200 mg/50 mg		non	cps ne doivent pas être machés, coupé, broyés	Kaletra 80 mg/20 mg solution buvable
KEFORAL cp 500 mg, 1g		non	Aucune donnée	Keforal poudre pour solution buvable
KERLONE cp 20 mg		oui		
KETEK cp pélliculé 400 mg		oui	Goût très amer	
KREDEX cp 6,25, 12,5, 25 mg		non	avaler au moment des repas pour éviter la survenue d'hypotension orthostatique	
LAMALINE gél	o	oui	Impossible car présence de poudre d'opium	Lamaline suppositoire
LAMICTAL cp dispersible 2, 5, 25, 50, 100, 200 mg		oui	disperser le comprimé dans un peu d'eau	

SPECIALITES	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
LAMISIL cp séc 250 mg		oui	P.A. photosensible, risque de modification de la biodisponibilité	cp orodispersible
LAMPRENE capsule 50, 100 mg		non	contenu liquide huileux	
LANVIS cp 40 mg		non	cytotoxique: manipulation avec précautions	
LARGACTIL cp 25, 100 mg		non		Largactil solution buvable 25 mg/5 ml, 4 %
LARIAM cp 250 mg		oui	PA amer, irritant. Utilisation extemporanée	
LAROXYL cp 25, 50 mg		non	Aucune étude	Laroxyl oral 4 % solution buvable
LASILIX 20, 40, 500 mg		oui	PA photosensible	solution buvable 10 mg/ml
LASILIX RETARD gél LP 60 mg		oui	ne pas écraser les granules	préférer forme cp
LEDERFOLINE cp 5,25 mg		oui	A diluer dans l'eau, ne pas mélanger avec d'autres produits.	
LEPONEX cp 25,100 mg		non	écrasement possible mais pas de dissolution dans l'eau	
LEPTICUR 10 mg cp		oui		
LEVOTHYROX cp		non	↘ absorption avec alimentation	l-thyroxine en gtte
LEXOMIL 6 mg cp		oui		
LIORESAL 10 mg cp		oui		
LIPANTHYL gél 67, 200 mg		oui	peu soluble	

SPECIALITES	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
LISINOPRIL cp 5, 20 mg		oui		
LOGIMAX cp 5 mg		non	forme retard	
LOPERAMIDE gél 2 mg		non	Pas lieu de les écraser car il existe une solution alternative par la solution buvable	Imodium solution buvable
LOPRESSOR 100 mg cp		oui		
LOPRESSOR LP 200 mg cp pelliculé		non	Impossible car forme retard	
LOPRIL cp 25, 50 mg		oui		
LOXAPAC 50 mg cp	o	non	Modification de leur action pharmacocinétique et thérapeutique	Loxapac oral 1mg/goutte solution buvable
LOXEN cp 20 mg		oui	PA photosensible	
LOXEN gél 50 mg LP		oui	ne pas écraser les granules	
LUDIOMIL 25, 75 mg cp		oui	Risque de modification de la biodisponibilité	
LUTENYL 5 mg cp		oui		
LYRICA gél 25, 50, 75, 100, 150, 200, 300 mg		oui		
LYSANXIA cp 10, 40 mg		oui	à déliter	préferer Lysanxia goutte buvable
LYTOS 520 mg cp		non	Avec de l'eau, en dehors des repas, pas de laitage	
MALOCIDE cp 50 mg		oui		

SPECIALITES	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
MAG 2 cp 100 mg		non		sachet buvable
MANTADIX capsule 100 mg		non	impossible car capsule	
MEBEVERINE gél 200 mg		non	ne pas écraser les granules	
MEDROL cp 100 mg		oui	administrer après dispersion dans de l'eau	préférer AIS soluble type Solupred
MEGACE cp 160 mg		non	cytotoxique: manipulation avec précaution	
MELADININE cp 10 mg		oui		
MENAELLE 100 mg capsule		non	excipient huileux	solution injectable IM, capsules vaginales
MEPROBAMATE cp 200, 400 mg		oui		
MESTINON cp 60 mg		oui		
METHOTREXATE cp 2.5 mg		non	cytotoxique: manipulation avec précaution	
METOPIRONE capsule 250 mg		non	contenu liquide huileux	
MIANSERINE EG cp pelliculé 10, 30, 60 mg		oui	Utiliser rapidement, effet anesthésique de contact	
MICROPAKINE granulés		non	forme à libération prolongée/microgranules de petite taille	solution buvable Dépakine 200mg/mL
MININIRIN cp		non		Minirin solution endonasale 0,1 mg/ml
MINI-SINTROM cp 1 mg		oui	attention cp très petit, médicament à marge thérapeutique étroite	
MOCLAMINE cp 150 mg		oui		
MODAMIDE cp 5 mg		oui		
MODIODAL cp 100 mg		oui		

SPECIALITES	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
MODITEN cp 100 mg		oui	PA photosensible	préférer solution buvable 4 %
MODOPAR gél 62,5, 125, 250 mg		non	avaler la gélule entière, sans la croquer, ni l'ouvrir	Modopar cp dispersible
MODOPAR cp dispersible 125 mg		oui	à dissoudre dans boisson	
MODOPAR LP gél 125 mg		non	forme à libération prolongée	Modopar cp dispersible
MODURETIC cp sécable		oui	goût désagréable	
MOLSIDOMINE cp 2, 4 mg		oui		
MONICOR LP gél 20, 40, 60 mg		oui	ne pas écraser les microgranules qui sont à libération prolongée	
MONOTILDIEM gél LP 200 mg , 300 mg		non	ne pas écraser les microgranules qui sont à libération prolongée	Autres inhibiteurs calciques
MOPRAL gél 20 mg		oui	ne pas écraser les granules gastrorésistantes	Risque d'obstruction de la sonde Préférer IPP forme orodispersible
MOSCONTIN cp 10, 30, 60, 100, 200 mg		non	forme à libération prolongée	SkenanLP sans écraser les granules
MOTILIUM 10 mg cp		non	Possibilité d'écraser les cpés si administration par SNG	Préferer la forme buvable ou les granulés effervescents
MYAMBUTOL cp 400 mg		oui		
MYCOSTATINE cp 5 MUI		oui	Préférer la solution buvable	Mycostatine oral 100 00UI/ML suspension
MYLERAN cp pellic 2 mg		non	cytotoxique: manipulation avec précaution	
MYNOCINE 100 mg gél		oui		
MYOLASTAN 50 mg cp		non	P.A. sensible à l'humidité et insoluble dans l'eau	Autre myorelaxant: Thiocolchicoside cp
MYSOLINE 250 mg cp		oui		
NAPROZYNE cp 250, 500, 750, 1000 mg		non	Aucune étude	Naprozyne suppo
NATULAN gél 50 mg		non	cytotoxique: manipulation avec précaution	

SPECIALITES	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
NEO-MERCAZOLE cp 5, 20 mg		oui	peu soluble dans l'eau	
NEORAL capsule 10, 25, 50, 100 mg		non	excipient huileux. Ne pas avaler avec du jus de pamplemousse	Neoral sol buv 100 mg/ml Fl 50 ml
NEULEPTIL gél 10 mg		non	P.A. très photosensible	Neuleptil 4 % solution buvable 30 ml
NEULEPTIL cp 25 mg		non	PA photosensible	Neuleptil 4 % solution buvable 30 ml
NEURONTIN gél 100, 300, 400 mg		oui		
NICOBION cp 500 mg		oui	Goût amer	
NIDREL cp 10 mg		oui	ne pas écraser à l'avance	
NIFLURIL gél 250 mg		oui	goût désagréable	préférer Nifluril suppo, indocid goutte
NIFUROXAZIDE gél 200 mg		non		solution buvable 4 %
NILEVAR cp 10 mg		oui		
NIMOTOP cp 30 mg		oui	PA photosensible, administration immediate	
NISIS cp 160 mg		non	Aucune étude	
NIVAQUINE cp 100 mg		oui		forme sirop ou lariam oral cp 250 mg
NIZORAL cp 200 mg		non	Aucune étude	préférer suspension buvable 2 %
NOOTROPYL cp 800 mg		oui	goût désagréable	Nootropyl injectable ou buvable 20 %
NOLVADEX cp 10, 20 mg		oui	cytotoxique: manipulation avec précaution	
NORFLOXACINE cp sécable 400 mg		oui		
NOROXINE cp 400 mg		oui	Goût amer	
NORSET cp 15 mg		non	PA amer	Norset suspension buvable

SPECIALITES	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
NORVIR capsule molle100 mg		non	Impossible car capsule molle	Norvir 80 mg/ml solution buvable
NOVONORM cp 0,5, 1, 2 mg		oui		Adapter la posologie,
NOZINAN cp 25, 100 mg		non	Aucune étude	Nozinan oral 4 % solution buvable
OFLOCET cp 200 mg		oui	administration immédiate P.A. photosensible	
OFLOXACINE EG cp pelliculé sécable 200 mg		oui		
OGAST gél 15, 30 mg		oui	Ne pas écraser les microgranules	Préférer cp dispersibles (Ogastoro)
OLMIFON cp pélliculé 300 mg		oui	administration immédiate P.A. photosensible	
OMEPRAZOLE gél		oui	Ne pas écraser les microgranules	Préférer les IPP orodispersibles
OMIX gél 0,4 mg LP		oui	Ne pas écraser les microgranules	
ORACILLINE cp 1 M UI		non	Aucune donnée	Oracilline 0,25 MUI suspension buvable
ORBENINE gél 500 mg		oui		autre Oracilline
ORAP cp 1, 4 mg		oui		
ORELOX cp 100 mg		non	goût désagréable	Forme pédiatrique solution buvable
OROKEN cp 200 mg		oui		poudre pour susp buvable 40 mg/5 ml (nourrisson) ou 100 mg/5 ml (enfant)
OSFOLATE gél		oui		
OXEOL cp 10, 20 mg		oui		
OXYBUTYNINE cp sécable 5 mg		oui		
OXYCONTIN cp LP 120 mg		non	forme à libération prolongée	
OZIDIA cp LP 5, 10 mg		non	forme à libération prolongée	

SPECIALITES	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
PALUDRINE cp 100 mg		oui	très amer ,administration immédiate	
PARACETAMOL cp		oui		préférer forme effervescente
PARACETAMOL gél		oui		préférer forme effervescente
PARIET cp 10, 20 mg		non	cp gastrorésistant mais cp très petit	Autre IPP orodispersibles
PARKINANE LP gél 2, 5 mg		oui	Ne pas écraser les microgranules	Artane oral solution buvable 0,4 % 0,1 mg/goutte
PARLODEL gél 5, 10 mg		oui		
PARLODEL cp sec 2,5 mg		non	Pas de données laboratoire	
PEFLACINE cp 400 mg		oui	P.A. photosensible	
PENTASA cp 500 mg		non	Cp avec enrobage libération contrôlée. Forme sachet peut être administrée par sonde naso gastrique	Granules sachets, susp rectale selon indication
PENTOXIFYLLINE cp LP 400 mg		non	forme à libération prolongée	Autre antiischémique: buflomédil
PERIACTINE cp 4 mg		oui		
PERISTALTINE cp 100 mg		oui		
PERMIXON gél 160 mg		oui	goût désagréable	
PERSANTINE cp 75 mg		non	goût désagréable	
PIPRAM FORT cp 400 mg		oui		
PIRACETAM cp pellicullé sécable 800 mg		oui	goût désagréable	solution buvable
PIRILENE 500 mg cp blister		oui		
PIROXICAM gél 20mg		oui		cp dispersible

SPECIALITES	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
PLAQUENIL cp 200 mg		non	Très forte amertume du PA	
PLAVIX cp 75 mg		oui	goût amer	
PNEUMOREL cp 80 mg		non	Impossible car forme considérée comme LP (cp dragéifié)	Pneumorel suspension buvable 0,2 %
POLARAMINE cp 2 mg		non		Polaramine oral 0,5 mg/5 ml sirop
POLARAMINE REPETABS cp 6 mg		non	Modification de la biodisponibilité	Polaramine oral 0,5 mg/5 ml sirop
PRADAXA gél 110 mg		non	pourrait augmenter le risque de saignement	
PRAXILENE cp 200 mg		non	irritant pour l'œsophage	
PRAZINIL cp 50 mg		oui		
PREDNISOLONE cp effervescent 20 mg		oui	à diluer dans l'eau	
PREVISCAN cp quadrisécable 20 mg		oui	Produit à marge thérapeutique étroite, attention à la dose.	Porter attention à la précision de la dose
PRIMPERAN cp 10 mg		oui		Primperan solution buvable 2,6 mg/ml (enf+nourr), 0,1 % (adulte)
PROFENID cp 100 mg, 150 mg		non	P.A. photosensible	Profenid suppo
PROFENID gél 50 mg		oui	P.A. photosensible	Profenid suppo
PROFENID gél LP 200 mg		oui	Ne pas écraser les microgranules P.A. photosensible	Profenid suppo
PROGLICEM gél 25, 100 mg		oui		
PROGRAF gél 0,5, 1 mg		oui		
PROPRANOLOL cp 40 mg		oui		
PROPYLTHIOURACILE cp 50 mg		oui		

SPECIALITES	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
PROZAC gél 20 mg		oui		Prozac solution buvable 20 mg/5 ml, cp dispersibles sécables
PURINETHOL cp 50 mg		non	cytotoxique: manipulation avec précaution	
PYOSTACINE cp 250, 500 (séc) mg		oui	goût amer	
QUINIMAX cp sécables 125, 500 mg		oui		
RANIPLEX cp 75, 150, 300 mg		non	P.A. photosensible	cp effervescent
RANITIDINE cp pellicullé 75, 150, 300 mg		non	P.A. photosensible	cp effervescent
RAPAMUNE cp 0,5, 1, 2 mg		non	Ne pas avaler avec du jus de pamplemousse	solution buvable 1mg/mL
RASILEZ cp 150 mg		non	ne pas dissoudre, administrer de façon extemporanée sur un aliment semi-solide, goût amer	
REBETOL gél 200 mg		non	P.A. cytotoxique	
REMINYL cp 4, 8, 12 mg		oui		solution buvable
REQUIP cp 0,25, 0,5, 1, 2, 5 mg		oui		
RENITEC cp 5, 20 mg		non	dégradation du PA en milieu acide. PA hygroscopique et photosensible	
RETROVIR gél 100 mg		non	Ne pas croquer, ni écraser	Retrovir solution buvable 10 mg/ml
RETROVIR 300 mg cp		non	Ne pas croquer, ni écraser	Retrovir solution buvable 10 mg/ml
REVIA 50 mg cp		non		
RIFADINE 300 mg gél		oui		Rifadine suspension buvable
RIFATER cp		oui	Goût amer	
RIMIFON cp 50, 150 mg		oui		

SPECIALITES	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
RISORDAN cp 20 mg		non	avaler directement sans sucer, ni croquer	forme gélule LP Langoran ou générique
RISORDAN cp LP 60 mg		non	forme à libération prolongée	Risordan non LP
RISPERDAL cp 1, 2, 4 mg		non	Goût amer	sol buv 1 mg/ml ou cp orodispersible
RIVOTRIL cp 2 mg		non	Aucune étude	Rivotril solution buvable à 2,5 mg/ml
ROCALTROL capsule 0,25 µg		non		
ROHYPNOL cp 1 mg		oui		
ROVAMYCINE cp 3 MILLIONS UI		non	Aucune étude	Rovamycine granulé 1,5M UI sachet
ROXITROMYCINE cp pellicullé 150 mg		non		forme sachet 50 mg
RULID cp 100, 150 mg		oui	peut être écrasé mais goût désagréable	Rulid oral 50 mg cp pour suspension buvable
RYTHMODAN gél 100 mg		oui		
RYTHMODAN cp LP 250 mg		non	Aucune étude	forme non LP ou Isorythm LP gél
RYTHMOL cp 300 mg		oui		
SABRIL cp 500 mg		non	Avalés entiers ou par demi-comprimé, avec au moins un demi verre d'eau	Sabril sachet 500 mg
SALAZOPYRINE cp 500 mg		non	cp gastrorésistant	Pentasa oral 500 mg seulement si maladie de crohn
SALBUMOL 2 mg cp		non	Aucune étude	salbutamol suppo
SANDIMMUM capsule 25, 50, 100 mg		non	Impossible car capsule molle	Sandimmum solution buvable 100 mg/ml
SECTRAL cp 200, 400 mg		non	préférer la solution buvable	Sectral oral 40 mg/ml suspension buvable
SECTRAL cp LP 500 mg		non	Aucune donnée. Administration extemporanée. Goût désagréable	Sectral oral 40 mg/ml suspension buvable
SELOKEN cp LP 200 mg		non	forme à libération prolongée	

SPECIALITES	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
SERC cp 8 mg		oui	Excipient irritant les muqueuses	
SERECOR gél LP		oui	ne pas écraser les microgranules	
SERESTA cp 10, 50 mg (séc)		oui		
SERMION gél 5, 10 mg		oui		Sermion lyoc
SEROPRAM cp 20 mg		non	PA amer	solution buvable 40mg/mL
SEVREDOL cp sécable 10, 20 mg		non	A avaler tels quels avec une petite quantité de boisson	Actiskenan gél, morphine buvable amp
SINEMET cp		oui	Aucune étude	
SINEMET cp LP		non	Ne pas croquer	forme non LP
SINTROM cp quadrisecable 4 mg		oui	Produit à marge thérapeutique étroite, attention à la dose.	Porter attention à la précision de la dose
SKENAN LP gél 10-30-60-100 mg		oui	sonde de taille suffisante/ ne pas écraser les micorgranules/ bien rincer la sonde	solution buvable de morphine
SOLIAN cp 100, 200 mg sec		non	Ne pas croquer,ni macher	Préferer la solution buvable 100 mg/ml
SOLUPRED cp effervescent		oui	dissoudre le cp	
SOPHIDONE LP gél 4, 8, 16, 24 mg		oui	forme à LP, les granules ne doivent pas etre écrasées	
SOTALEX cp sécable 80, 160 mg		oui	le reduire en poudre	
SOTALOL cp sécable 80,160 mg		oui		
SPASFON LYOC 80 mg		oui		
SPASFON cp 80 mg		non	goût amer	forme lyoc
SPECIAFOLDINE cp 0,4, 5 mg		oui		

SPECIALITES	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
SPIROCTAZINE cp 25 mg		oui		
SPIRONOLACTONE ALTIZIDE cp		oui		
SPORANOX gél 100 mg		non	risque de colmatage des sondes	Sporanox en solution buvable pour les sondes
STABLON cp 12.5 mg		oui		
STAGID cp 700 mg		oui		
STILNOX cp 10 mg		oui	P.A. photosensible	
SUBUTEX cp sublingual 0,4, 2, 8 mg		non	Laisser fondre sous la langue	
SULFARLEM S cp enrobé 25 mg		oui	Broyage possible pour sonde naso-gastrique	
SURBRONC cp 30 mg		non		Solution buvable
SURGAM cp sécable 100, 200 mg		oui		
SUSTIVA gél 50, 100, 200, 600 mg		non	mélanger excipient aqueux	solution buvable 30 mg/ml
SYNEDIL gél 0,5 mg/100 ml		non		solution buvable
TADENAN caps molle 50 mg		non	excipient huileux	
TAGAMET cp 200 mg		non	Aucune donnée	Tagamet oral cp effervescent 200 mg
TAGAMET cp effervescent 200 mg		oui	dissoudre le cp	
TAHOR cp 10, 20, 40, 80 mg		oui		
TAMIFLU gel 30, 45, 75 mg		oui		granulés pour suspension buvable 12 mg/ml
TAMOXIFENE cp 10, 20 mg		non		
TANGANIL cp 500 mg		oui		

SPECIALITES	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
TARDYFERON cp 80 mg		non		Fumafer pdre oral 33 mg/1g
TARDYFERON B9 cp		non		Fumafer pdre oral 33 mg/1g
TAREG cp 40, 80, 160 mg		non	ne pas dissoudre, administrer de façon extemporanée sur un aliment semi-solide	
TEGRETOL LP cp 200, 400 mg		non	forme à libération prolongée	forme suspension buvable 20 mg/ml
TEGRETOL cp 200 mg		non		forme suspension buvable 20 mg/ml
TEMESTA cp 1, 2,5 mg		oui		
TEMGESIC cp sublingal		non	faire fondre le cp sous la langue	
TEMODAL gé l 5, 20, 100, 250 mg		non	cytotoxique: manipulation avec précaution	
TENORMINE cp 50, 100 mg		oui		
TERALITHE cp LP 400 mg		non	forme à libération prolongée	
TERALITHE cp 250 mg		non	Aucune étude réalisée	préférer Neurolithium amp buvable
TERCIAN cp 25, 100 mg		non	Pas lieu de les écraser car il existe une solution alternative par la solution buvable	Tercian oral 40 mg/ml solution buvable
THEOPHYLLINE gel LP 50, 400 mg		non	forme à libération prolongée	Euphylline LA gél
THIOCOLCHICOSIDE comprimé sécable 4 mg		oui	possibilité d'avaler le cp avec un pansement gastrique	
TIAPRIDAL cp 100 mg		oui		Solution buvable 5 mg/goutte
TIBERAL cp 500 mg		oui		Flagyl oral 4 % suspension buvable
TICLID cp 250 mg		oui	Administration immédiate car photosensible	
TILDIEM cp 60 mg		non	Ne pas croquer	Autres inhibiteurs calciques: Nifédipine solution buvable, Amlodipine, Isoptine

SPECIALITES	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
TIORFANOR 175 mg cp		non		solution buvable et gél pouvant être ouvertes
TOPALGIC cp LP 100 mg		non	forme à libération prolongée	Topalgic oral 50 mg gelule
TOPALGIC gél 50 mg		oui		
TORENTAL cp LP 400 mg		non	forme à libération prolongée	
TRAMADOL comprimé 50 mg		non		cp effervescent
TRANDATE cp 200 mg		oui		
TRANXENE gél 5, 10, 20 mg		oui		préférer Lysanxia solution buvable sauf indication tétanos
TRANXENE cp		oui		
TREDEMINE cp 500 mg		oui	à avaler avec très peu d'eau pour atteindre l'estomac sous forme solide	
TRENTADIL cp 300 mg		oui	goût amer	Euphylline oral, forme suppo
TRIATEC gél 1,25-2,5-5-10 mg		oui	stable en suspension 30 min	
TRIFLUCAN gél 50, 100 mg		oui	Administration avec des aliments semi solides possible	Solution buvable 50 mg/5ml et 200 mg/5ml
TRILEPTAL cp 300 mg		oui		Trileptal solution buvable 60 mg/ml
TRIMEBUTINE cp 100-200 mg		non		
TRIMETAZIDINE cp pellicullé 20 mg		non		
TRINITRINE		oui	croquer lentement	dispositifs transdermiques
TRIVASTAL L.P. cp 50 mg		non	forme à libération prolongée	
TRIVASTAL cp 20 mg		oui		
TROLOVOL cp 300 mg		oui		

SPECIALITES	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
UBITEN gél 50 mg		oui		
UFT gél		non	cytotoxique: manipulation avec précaution	
UN-ALFA capsule 0,25, 0,5 mg, 1 µg		non	excipient huileux	Un -alfa solution buvable 0,1 µg/goutte
URBANYL cp 5, 10, 20 mg		non	Peu soluble dans l'eau	
UROMITEXAN cp 400, 600 mg		non	Aucune étude réalisée. Ampoule par voie injectable peuvent être avalées	forme injectable
UTROGESTAN capsule 100-200 mg		non	Suspension en phase huileuse	
VALIUM cp 2, 5, 10 mg		non		solution buvable 1 %
VASTAREL cp 20 mg		oui		solution buvable 20 mg/ml cp effervescent
VASTAREL LM 35 mg		non	forme à libération modifiée	solution buvable 20 mg/ml
VASTEN cp 10 (sec), 20 mg (sec), 50 mg		oui		
VECTARION cp 50 mg		oui		
VEPESIDE caps 50 mg		non	Produit cytotoxique	
VERAPAMIL cp LP		non	forme à libération prolongée	
VERAPAMIL cp 40 et 120 mg		non		
VIBRAMYCINE cp sécable 100 mg		oui	bien agiter après la dispersion du comprimé dans l'eau	
VIDEX cp à croquer, dispersible 25, 50, 100, 150 mg		oui	mâcher les comprimés ou les disperser dans de l'eau Prendre deux cps à la fois (quantité suffisante d'anti-acide)	solution buvable
VIRACEPT cp 250 mg		oui	peut être administré par sonde mais préferer la forme poudre	Viracept 50 mg/g poudre orale
VIRAMUNE cp 200 mg		non	Ne pas croquer	suspension buvable 50 mg/5 ml

SPECIALITES	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
VISCERALGINE cp 50 mg		non	préférer autres antispasmodiques	
VITAMINE B1 B6 cp		oui	Goût amer et odeur désagréable	
VITAMINE K1 cp 10 mg		oui		Solution buvable et injectable à 10 mg/ml ou 2 mg/0,2 ml
VOLTARENE cp 50 mg		non		Voltarène suppo, autres AINS
XANAX cp 0,25 ,0,5, 1 mg		oui		
XATRAL LP 5, 10 mg		non	forme à libération prolongée	
XATRAL 2,5 mg		oui	Pelliculage opaque protège le PA et masque amertume	
ZACNAN gél 100 mg		oui		
ZAMUDOL LP gél 50, 100, 150, 200 mg		oui	ne pas écraser les microgranules	Tramadol 50 mg à libération immédiate
ZECLAR cp 250, 500 mg		oui		
ZEFFIX cp 100 mg		non	Ne pas croquer	Zeffix 5mg/ml solution buvable 240 ml
ZELITREX cp 500 mg		non	Pas lieu de les écraser car il existe une solution alternative par la solution buvable	Zovirax suspension buvable
ZENTEL cp 400 mg		non		Zentel 4 % suspension buvable Fl 10 ml
ZERIT gél 20, 30, 40 mg		oui	ouvrir avec précaution et mélanger avec aliments	poudre pour susp buvable 200 mg
ZESTRIL 20 mg cp		oui		
ZITHROMAX 250 mg		non	PA photosensible	
ZOCOR cp 5, 20, 40 mg		non	Excipient irritant les muqueuses	Autre statine
ZOLOFT gél 50 mg		non	Aucune donnée	
ZOLPIDEM EG cp pellicullé sécable		oui	PA photosensible	

SPECIALITES	Broyage Ouverture	Sonde entérale	Explications remarques	Alternative
ZOMIG cp 2.5 mg		non	Aucune donnée	Préférer la forme Zomig ORO, orodispersible
ZOPHREN cp 4, 8 mg		non	Goût amer	Zophren cp lyoph ou sirop
ZOPHREN cp lyoph		oui	Laisser fondre sous la langue	après dissolution dans l'eau ou sirop à 4 mg/5 ml
ZOPICLONE EG cp pellicullé sécable 7,5 mg		oui	PA photosensible	
ZOVIRAX cp 200, 800 mg		non	Peut être dissous dans l'eau	suspension buvable 200 mg/5 ml
ZOXAN LP 4, 8 mg		non	forme à libération prolongée	
ZYLORIC cp 100, 200, 300 mg		oui		
ZYPREXA cp 5, 7,5, 10 mg		non	ne pas croquer	Zyprexa velotab 10 mg
ZYPREXA VELOTAB cp		oui	orodispersible, doit être dissous dans eau, lait, café, jus de pommes ou jus orange	