

## HTA

### – Fiche d'information détaillée de l'indicateur –

1<sup>ère</sup> mise en œuvre de l'indicateur : 2<sup>nd</sup> sem. 2018... / Dernière mise en œuvre de l'indicateur : en cours

#### CONTEXTE

Le patient hypertendu traité nécessite une surveillance rénale régulière afin de dépister certaines complications liées à l'affection elle-même ou aux médicaments prescrits.

Ainsi les recommandations de l'HAS préconisent notamment un contrôle biologique (Na, K, créatininémie, recherche de protéinurie quelle que soit la méthode) tous les 1 à 2 ans, ou plus fréquemment en cas de diabète, d'insuffisance rénale, de protéinurie, d'HTA mal contrôlée, de décompensation cardiaque ou d'autres événements intercurrents (pouvant par exemple entraîner une hypovolémie).

#### OBJET

L'indicateur présente la part des patients hypertendus pour lesquels un bilan rénal de surveillance annuel a été réalisé.

#### REFERENCES

- Prise en charge de l'HTA de l'adulte, Recommandation de bonne pratique, 2016  
[https://www.has-sante.fr/jcms/c\\_2059286/fr/prise-en-charge-de-l-hypertension-arterielle-de-l-adulte](https://www.has-sante.fr/jcms/c_2059286/fr/prise-en-charge-de-l-hypertension-arterielle-de-l-adulte)
- L'hypertension artérielle (HTA) : les recommandations de l'ESC/ESH 2018  
<https://www.cardio-online.fr/Actualites/A-la-une/recommandations-esc-2018-hypertension-arterielle>
- 2018 ESC/ESH Clinical Practice Guidelines for the Management of Arterial Hypertension (ressource en anglais)  
<https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Arterial-Hypertension-Management-of>

#### CONSTRUCTION

##### Formule :

Nombre de patients sous antihypertenseur avec un dosage de la kaliémie et de la créatininémie et une évaluation de la clairance de la créatinine dans l'année, parmi ...

$$\text{Tx} = \frac{\text{... les patients sous antihypertenseur}}{\text{... les patients sous antihypertenseur}} \times 100$$


##### Inclusions particulières :

- Numérateur
  - « dans l'année » correspond aux 365 jours qui précèdent la dernière délivrance d'anti-HTA sur le semestre observé
  - Le MG n'est pas forcément le prescripteur des dosages biologiques. Les dosages biologiques n'ont pas nécessairement été faits le même jour.
- Dénominateur
  - Patients de 40 ans et plus
  - ayant ou non déclaré le MG comme médecin traitant
  - avec au moins 3 délivrances d'au moins 1 anti-HTA (sur prescription du MG) sur la période d'un an qui précède la dernière délivrance sur le semestre observé (la dernière délivrance est prise en compte dans le décompte des 3 délivrances)

##### Exclusions particulières :

- Numérateur
  -
- Dénominateur
  - Patient avec moins de 3 délivrances (soit 1 ou 2 délivrances sur prescription du MG) d'au moins 1 anti-HTA sur la période d'un an qui précède la dernière délivrance sur le semestre observé.

##### Particularités et/ou limites de la requête

-  Certains médicaments antihypertenseur peuvent avoir d'autres indications que l'hypertension (migraine, varices œsophagiennes, extra systoles supraventriculaires, ...). Ne pouvant déterminer le motif de la prescription, ces patients seront intégrés au dénominateur.

#### EVOLUTION ATTENDUE

Une augmentation du pourcentage est attendue au fur et à mesure du temps